

Физическими симптомами сексуального насилия над ребенком

являются:

- порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье;
- гематомы (синяки) в области половых органов;
- кровотечения, необъяснимые выделения из половых органов;
- гематомы и укусы на груди, ягодицах, ногах, нижней части живота, бедрах;
- боль в животе;
- повторяющиеся воспаления мочепускающих путей;
- венерические болезни;
- неожиданная беременность (если несовершеннолетняя девушка отказывается назвать отца ребенка или беременность у девочек от 9 лет с недостаточным уровнем психосексуального развития).

Главными последствиями насилия являются:

виктимность, немотивированная агрессия и воспроизводство самой жестокости, трудности в социализации и построении отношений, эмоциональные проблемы, задержка физического и психического развития, тревожность и страхи (перед каким-то человеком, местом, темнотой); низкая самооценка, вызывающее и эксцентричное поведение, недоверие к людям.

УО «Могилевский государственный профессиональный лицей №7»

Рекомендации по выявлению жертв насилия

8-801-100-8-801

Общенациональная горячая линия для пострадавших от насилия

+375-44-7-607-603

Горячая линия для пострадавших от насилия

+375297448787 Яценко Е.Ю.

Закрепленный за МГПЛ №7 инспектор ИДН

63-23-32 СППС МГПЛ №7



Рекомендации педагогам «Как вести себя, если ребенок рассказывает вам о насилии»

*Отнеситесь к тому, что рассказал вам ребенок, серьезно. Он не будет лгать о пережитом жестоком обращении, особенно если он рассказывает очень эмоционально, с подробностями, эмоции соответствуют пережитому состоянию.

*Дайте возможность ребенку выплеснуть свои эмоции.

*Будьте выдержаны, если ребенку трудно открыться эмоционально. Помните, что нужно терпение, так как убедить ребенка поверить может оказаться нелегко.

*Пользуйтесь теми же словами, которые использует ребенок, не делайте ему замечаний за использование непристойных выражений, так как для него это может быть единственным способом описать случившееся.

*Повторите ребенку еще раз, что вы верите тому, что он рассказал.

*Заверьте ребенка, что сначала согласуете с ним свои действия и всегда будете его поддерживать. Не обещайте, что не расскажите об услышанном.

*Скажите ребенку, что вы хотите ему помочь, но не торопитесь придумывать решения.

*Будьте честны. Объясните ему, что конкретно вы собираетесь делать дальше, и спросите, согласен ли он с вашими намерениями («Мне надо сказать кое-кому (педагогу-психологу, социальному педагогу или милиционеру) о том, что случилось. Они захотят задать тебе несколько вопросов. Они помогут сделать так, чтобы ты почувствовал(-а) себя в безопасности». Скажите ребенку: «Бывают такие секреты, которые нельзя хранить, если тебе сделали плохо»).

*Обговорите с ребенком разные возможности, предложите посоветоваться со знающими людьми и (может быть) попросить у них помощи.

*Обратитесь за профессиональной помощью – психологической, правовой, медицинской. Настаивайте на прохождении медицинского осмотра как можно скорее, даже если нет видимых повреждений.

*Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит своего противника или сердится на него (он может оказаться членом семьи, родителем или опекуном). Терпеливо отвечайте на вопросы, рассеивайте тревоги ребенка.

*После окончания разговора сделайте подробную запись.

*Если насильник – в семье (отец, отчим, брат), то необходимо изъятие ребенка из семьи.

Признаками перенесенного сексуального насилия являются различные изменения в поведении:

-Изменения в проявлениях сексуальности (чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания; соблазняющее поведение по отношению к противоположному полу и взрослым и т.д.)

-Изменения в эмоциональном состоянии и общении (изоляция, уход в себя, отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство собственной испорченности, терроризирование младших детей и сверстников)

-Изменения мотивации ребенка, социальные признаки (неспособность защитить себя, непротивление насилию и издевательствам над собой, смирение резкое изменение успеваемости)

-Изменения самосознания ребенка (снижение самооценки; мысли о самоубийстве, попытки самоубийства)

-Появление невротических и психосоматических симптомов (боязнь оставаться в помещении наедине с определенным человеком; боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от участия в занятиях физкультурой или плаванием или снимать нижнее белье во время медицинского осмотра) головная боль, боли в области желудка и сердца).